



Endodontists

Dr. Iván E. Rodríguez
Dr. Adalí Efraín Vélez
Dr. Ernesto G. Treviño

www.valleyendopractice.com

1610 E. Harrison Ave.
Suite A
Harlingen, TX 78550
(956) 412-9500
(956) 412-1146 fax

5421 S. McColl Rd.
Stoneridge Business Park
Edinburg, TX 78539
(956) 994-9500
(956) 686-4095 fax

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE HOY

No coma o mastique nada duro en las próximas 2 horas hasta que el efecto de la anestesia se haya disipado tanto en la lengua como en los labios, pues fácilmente se puede lastimar y no darse cuenta. Evite alimentos duros como: semillas (maní, nueces), huesos, hielo, etc., pues los dientes aún no restaurados son susceptibles a fracturas.

Es posible que su diente esté sensitivo o adolorido por los próximos 2 a 3 días. Esto es así por la condición previa de su diente y por la manipulación y tratamiento realizado hoy. No se debe alarmar por este tipo de molestia porque las mismas son normales y en ninguna manera afectan el resultado final (o prognosis) del tratamiento. Para aliviar las molestias puede tomar entre 600 a 800mg de Ibuprofeno (Advil, Motrin IB, o cualquier otro analgésico similar) cada 4 a 6 horas, si es que no es alérgico a la aspirina o alguno de estos medicamentos. Si es alérgico a ellos entonces, puede sustituir con 500 a 1,000 mg de acetaminofeno (Tylenol). Siga cualquier indicación específica que le dé el fabricante del medicamento o el doctor. Es bueno que se tome dichos medicamentos cuando aún está anestesiado, para que el efecto del medicamento empiece a trabajar inmediatamente. Puede, además, hacer buches de agua tibia con una cucharada de sal para reducir un poco la inflamación y la edema que pueda tener.

Mientras el diente esté aún tierno o lastimado evite comer con esa área de la boca. Si desarrolla dolor, inflamación, hinchazón o fiebre llame inmediatamente a la oficina.

Usted puede notar un sabor a “medicamentos” entre las citas. Esto se debe al efecto penetrante de algunos de estos medicamentos que fueron colocados en el diente. Este mal sabor a pesar de no ser agradable, no es dañino.

Por último, es normal que una capa fina de la restauración temporera se desgaste con la masticación. Lo importante es que el acceso de los conductos esté bien sellado. Si por el contrario todo el temporero se cae o se sale (o si usted tiene duda sobre ello) entre las citas, favor de llamar a la oficina para reemplazarlo y sellar de nuevo.

Si tiene preguntas, dudas o problemas, llame a la oficina o al celular de su doctor. No dude en consultar.

Oficina – Jct 49th St & 78th St; 722-634-7222 / Gf Rd; 78th St; 6th St; 722

Dr. Rodriguez cell: (956)-279-3569 Dr. Vélez cell: (956)-873-1988 Dr. Treviño cell: (956)-279-0979

Para mayor información sobre Endodoncia busque en: www.valleyendopractice.com o www.aae.org

Iniciales de recibo: _____ Date _____